

# 3 โรค มาทั้งบุงลาย



**โรคไข้เลือดออก**  
(Dengue hemorrhagic fever)

**โรคไขปวดข้อบุงลาย**  
(Chikungunya disease)



**โรคติดเชื้อไวรัสซิกา**  
(Zika virus disease)



# โรคไข้ปวดข้อยุ่งหลาย



## อาการ



ไข้สูง



ผื่นแดง



ปวดข้อ



ปวดหัว  
ปวดกล้ามเนื้อ

## ข้อควรระวัง



หากมีอาการ  
ให้รีบพบแพทย์



**ห้าม**ใช้ยาในกลุ่ม **NSAIDs** เช่น  
ยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน  
ยาไดโคลฟีแนค

## การป้องกัน



**เก็บบ้าน**  
ให้ปลอดโปร่ง  
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



**เก็บขยะ**  
กำจัดแหล่ง  
เพาะพันธุ์ยุง



**เก็บน้ำ**  
ปิดฝาให้มิดชิด  
ไม่ให้ยุงวางไข่

# โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



## อาการ



มีไข้



ตาแดง



ผื่นแดง



ปวดข้อ

## การป้องกัน



**เก็บบ้าน**

ให้ปลอดโปร่ง  
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



**เก็บขยะ**

กำจัดแหล่ง  
เพาะพันธุ์ยุง



**เก็บน้ำ**

ปิดฝาให้มิดชิด  
ไม่ให้ยุงวางไข่

## ข้อควรระวัง



หากมีอาการ  
**ให้รีบพบแพทย์**



**หญิงมีครรภ์** ติดเชื้อไวรัสซิกา เสี่ยง  
ทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก พัฒนาการช้า



**ห้าม** ใช้ยาในกลุ่ม **NSAIDs** เช่น ยาแอสไพริน  
ยาไอบูโพรเฟน ยาไดโคลฟีแนค

ข้อมูล : 21/07/66

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน  
1422



# โรคไข้เลือดออก



## อาการ



ไข้สูงลอย  
2-7 วัน



กินอาหาร  
ได้น้อย



ปวดเมื่อย  
ตามลำตัว



อ่อนเพลีย

## ข้อควรระวัง



หากมีไข้เกิน 2 วัน หรือ  
ไข้ลดลงแต่อาการไม่ดีขึ้น  
**ให้รีบไปพบแพทย์**



**ห้าม**ใช้ยาในกลุ่ม **NSAIDs** เช่น  
ยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน  
ยาไดโคลฟีแนค

## การป้องกัน



**เก็บบ้าน**

ให้ปลอดโปร่ง  
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



**เก็บขยะ**

กำจัดแหล่ง  
เพาะพันธุ์ยุง



**เก็บน้ำ**

ปิดฝาให้มิดชิด  
ไม่ให้ยุงวางไข่