

อาการ โรคไข้เลือดออก



ระวัง!
ยุงลาย
ตัวร้ายใกล้ตัว



1 ไข้สูงลอย
มากกว่า 2 วัน



2 ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ



3 มีจุดแดงเล็กๆ
ขึ้นตามตัว



4 อาเจียนเป็นเลือด



5 อุจจาระสีดำ

ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs

- ❌ ยาแอสไพริน
- ❌ ยาไอบูโพรเฟน
- ❌ ยาไดโคลฟีแนค

หากอาการไม่ดีขึ้น **ให้รีบพบแพทย์**



ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว!

- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
- เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน
- เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้ยุงเกาะพัก



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc.12.ddc.moph.go.th
กลุ่มส่งเสริมความเชื่อมโยงโรคละอับยุงลาย

สายด่วน
รณควบคุมโรค
1422

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569