

ระวัง! ไข้เลือดออก

อันตรายถึงชีวิต!

อาการควรรีบพบแพทย์

- ไข้สูงเฉียบพลัน
- ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
- ปวดกระบอกตา
- มีจุดเลือดออกตามตัว
- อาเจียน ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย ซึมลง

อย่าชะล่าใจ!

หากมีอาการรีบไป
โรงพยาบาลทันที

ไข้สูง
ปวดหัว
ปวดตัว...



อันตราย!
อาจเสียชีวิต
ได้เลยนะ!



ยุงลาย
กัด
ในเวลากลางวัน

ป้องกันได้! ไม่ให้ยุงลายเกิด

เก็บบ้านให้สะอาด

ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บน้ำให้มิดชิด

ปิดฝาภาชนะให้สนิท



เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน

ในแจกัน จานรองกระถาง



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ท่อน้ำทิ้ง คว่ำภาชนะ



ป้องกันยุงกัด

ทายากันยุง นอนในมุ้ง



ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดยุงลาย หยุดภัยไข้เลือดออก



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคเลishmaniasis



ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569